Fuella nera

1566Mtp34

\*\*INRA\*\* Collection Vassal-Montpellier

Inella mera 10 R75-306.310

tuntuuluutu Tuntuuluutu







grèce EMPLACEMENT NO R7 1 306. 310 NOM 1566. 34. Fuella vera = Sultanine bl Nbre Débourrement Nbre Fertin Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 163 193 0 163 19 3, 0 2 163 193 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C 3 Mill : Pour : A Baie: TG - G - M - P Dim: 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : 3,5 Port: mi enge

gia (27')

ANNEE: 1993

NOM Fuella néra EMPLACEMENT 10 R70-306 310 0

Sultanine blanch

4 luntunlunti

156634-												
ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Ubre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f   fin		Véraison début mi/v fin		Maturité		
1	H	22,3	£5.3×	0	0,5	29.5	1.6	3.6	19.7	25.7	3,8	20.8
2	5	(6,5	183,				Td			+1		+1
3	5	16,5	18.7	1	Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C							
A 5	5	14.3	183	0	Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim :							
		<i>)</i> '		- ;	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	1) 6	18 3	,33		Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: s - m - ar - fox - herb							
		-2			Pépins : avec - apyrène							
		,			Port: Vigueur:							
												,

AMBEE: 1994 NOM Fuella mèra = EMPLACEMENT lo R7 1 306. 310 Sultamine blanch 1566-34 Débourrement Ubre début mi/déb grap Hbre Ferti-lité Floraison Maturité уечх début mi/f | fin | début | mi/v | fin 3 3 1 3.3 3 3 3 Grappe : G - M - P Dim : 16 Compacité: L - M (C) 4 1 Pour : O Mill : O 731 1 Baie: TG - 5 - (M)- (P) Dim: 16×14 disc-sph-GIT-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : S - m - ar - fox - herb 1 (1 7.3 84 (0) Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :

ANNET : 1395 HOM Sullanue bl

+ 1 Juntumlanda

EMPLACEMENT NO R7 A 306 310 0

1566.34 Whre Débourrament yeux début mi/déb Mbre Ferti-Floraison Vérdebut mi/f | fin début Véraison Souche litő mi/v fin Maturité grap 8.6 14.6 947 1,8 1 H 1 0,6 0 0 2 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N- C 0 Mill: h Ą Baie: TO - G - H - P Dim: 0 4 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus (inc) - coloré 16 1 Saveur : (s)- m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort: 1/2 Vigueur: 3,5

N° d'ordre :

Juntumlumin

Désignation :

Fuella néra 10 R70-306.310 A.5

Emplacement :

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 1837 globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 91

Euella nera (1884) 10 R7 s. 306.310 s. 1

N° d'ordre :

44 Juntumlimite

Désignation :

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252)- vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 265) - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue. : coloré 264 - vert 265.

# ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Ivella méra (laliti) 10 R7 s. 306.310 s.3

Nº d'ordre : Désignation :

luntuuluuti

Emplacement :

# FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (44) - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 1/63) - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 ) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert fonce - autre.

# PETIOLE

Long 170 - moyen 171/- court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 1/17 / vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277, partiellement - +otalement.

Calvo 91

Enella néra (Lalite) 10 R7A-306,310 4.3 N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions: Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible (75) - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81. BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 14). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 / non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoíde 99 - obovoíde 100 - cylindroíde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105/- coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1.) A saveur neutre 112 / fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.) A pédicelle de couleur : verte 122)- rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 1/29) A pinceau : court 130 - moyen 131) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184)

A peau fine 135/- moyenne 136 - épaisse 137.

Avec pépins - apyrène.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139) - molle 140 - peu juteuse.

Juntumbunti

-Calvo 92

Luella néra (lufite) 10 R7 s-30 6.31 0 A. 1

DENOMINATION ;

EMPLACEMENT :

44 Juntanlanta

### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2) Sarment

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2)).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duyeteux (8) - cotonneux (9) Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus fonce (b) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (3).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 91 A

```
H° d'ordre :
Désignation: Fuella mera
Emplacement: 10R7 1 306 310
                                  : 1 - 2 - 3
Angle des nervures .
                                  : 4 - 5 - 6
Sexe
                                  : (7)-8-9
Li/L
                                  : (10)-(11) .
L2/L
                                  : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                : 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                  : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                         : (31) - (32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- (39)
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                : (40) - (41)
Dents : forme
                                  : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                         : 45 - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67)
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües
```

tuntunlimti